

太醫院經驗奇效良方大全

膈者為病巢氏以憂思食氣五寸為五噎以憂思寒熱氣為
三陽結謂之噎雖分之為二不云治療之法內經言三陽結謂之
膈三陽者大腸小腸膀胱是也結者熱結也小腸熱則血脈燥
大腸熱則後不圓膀胱熱則津液涸三陽結熱則前後閉澀不
通氣反上行食噎不下此皆熱證內經又云諸氣為陽也氣結
則脉結脉結於陽部必寸關緩澀而沉伏此謂之陽結也結者
乃結聚之義也膈者謂膈在心脾之間上下不通若格拒之狀
也或結於咽候時竟有所碍吐之不出嚥之不下由氣鬱痰搏
而然久則漸妨飲食而為膈也噎者飲食之際氣卒阻滯飲食
不下而為噎也夫凡憂愁憤怒益出於思思則傷神氣不舒泰
聚結不散為結為痞為膈為噎乃正氣虛使氣道壅塞大便自

結結則氣止不下食不得入入則反出俾腸涸胃空上吐下結遂成結腸反胃蓋氣膈之病胃中氣痞煩悶飲食不下或心下苦滿噎氣吞酸時聞食臭大小便閉澀不時吐逆皆由憂思傷氣故陽脉結而謂之膈氣也夫喜則氣散怒則氣逆憂則氣聚思則氣結悲則氣急恐則氣怯驚則氣亂此七氣不和則百病生膈噎之證得氣愈盛氣噎其脉緩澁食噎其脉短濇治法透膈陳氣化痰和胃後之孝者幸而辨之治證藥類開列于後

膈噎通治方

五噎散

治五噎食不下嘔哕痰多咽喉噎塞胃膈滿痛

人參

半夏

湯洗七次

桔梗

去苗

白豆蔻

木香

枳頭糠

沉香

不見火

華澄茄

枇杷葉

乾生薑

白朮

各一錢

甘草

炙五

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食後服

五膈散 治胃膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡心不進飲

食並皆治之

枳殼去穢

青皮去白

大腹子

半夏麴炒

丁香不果

天南星

錫炮

乾薑炮

麥麩炒

章梟仁

白朮

各一分

錢甘草炙五

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

瓜蒌實丸

治胃膈痞滿胃中痛喘急妨悶

瓜蒌實

另研

枳殼

去穢

半夏

湯洗

桔梗

去穢

炒

右為細末薑汁煮麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸食

後用淡薑湯下

五加末散

治脾胃不和胃膈痞悶氣逆生痰不進飲食如五噎

五膈並皆治之

白茯苓

去皮

縮砂

去皮

薏苡仁

炒

枇杷葉

去毛

桑白皮炒

沉香不見

五味子炒

木香不見

青皮去白

穀蘖炒

藿香

杜仲去皮炙

隨風子

石斛酒浸

大腹子炒

陳皮去白

半夏麴炒

黃神麴炒

檳榔各三分

白豆蔻

丁香

人參

白朮

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

五噎入柿乾一箇膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

人參丁香散 治脾胃不和停痰留飲不能運化腹脇脹滿短

氣噎悶或吐痰水噎醋吞酸不思飲食漸至羸瘦

人參去蘆

丁香

白芍藥

當歸去蘆

肉桂去皮

蓬朮煨

丁皮各

乾薑炮

茯苓去皮

香附子炒

白朮

甘草炙

山藥各一錢半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服

四七湯 治喜怒不節憂思兼併多生悲恐或時振驚致臟氣

不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉吐噯不下

皆七情所生

方見氣門

寬中散 治因憂恚鬱結或作寒熱速成膈氣不進飲食

白豈菴夫皮去白 青皮夫皮去白 縮砂夫皮 丁香各二

示香半 甘草炙二 陳皮夫白 香附子炒去

厚朴炒去粗皮 枳實製 沉香一 檳榔二

右為細末每服二茶不拘時用生薑鹽湯調服

寬膈丸 治七情鬱結膈塞不通及食冷物即發其病緊痛欲

吐食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆

麥門冬去心 甘草炙 人參四 川椒炒出

遠志去心

細辛去苗

桂心各三

乾薑炮一

附子炮一

右為細末煉蜜九如梧桐子大每服三五十九食前米湯

下夏加麥門冬甘草人參各一兩一方以吳茱萸代桂遇

寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不下飲食減少皆治之

沉香開膈散 治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇肋脹

沉香 白豆蔻

荊三稜

蓬義木

縮砂 草澄茄

草萊仁

益智仁

丁香 川白薑

人參

丁香各半

木香 白茯苓

香附炒

藿香葉

青皮 半夏炮

陳皮各一

甘草炒一分

右為齋末每服三升水一盞半生薑五片棗二枚煎至中

盞去滓食前服

沉香散 治五膈五噎胃中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞飲食不

化結氣不消常服順氣通噎寬中進食

白朮

茯苓

各半

木通

當歸

青皮

陳皮

大腹皮

大腹子

白芍藥

木香

各二

子蘇葉

枳殼

白芷

甘草

各一

沉香

一分

右為末每服二升水一盞生薑三片棗一枚煎至七分空

心溫服一方無木香

奪命回生散

治五膈五噎胃嘔吐不進飲食此藥多有神

効不可輕視

丁香

川芎

去土

白薑

南木香

肉桂

新羅人參

神麴

訶子

縮砂

義木

粉草

大草葉

取仁

巴豆十四枚去殼心膜不去抽冷

右日乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦盒內以油紙蓋盒口却用黃蠟和松脂鑄如法封固盒縫每以十二月上辰日或初入黃道生氣天月二德日至誠脩念於高地焚香埋土中三尺深至次年六月中伏節擇晴朗吉日取向當風處攤去溫氣以不漏瓦并收貯密封俟與人每服半匙臨睡百沸湯調半盞頓服仰卧片時徐以溫白粥壓下若羸弱只服一字二三服即能進食止嘔吐續以寬中散丁沉透膈湯橘皮煎丸厚朴煎丸等兼進佐助胃氣忌生冷魚腥粘膩硬物一兩月則全愈矣孕婦不可服

五膈散 治五膈氣痞心胃噎塞漸致羸瘦

人參 赤茯苓去皮 枳殼去心 厚朴薑汁炙

官桂法組 陳麴炒 訶藥剉皮 白朮

陳皮去湯浸

乾薑炮

荆三稜煨

檳榔

木香不見

甘草炙各

右為細末每服二錢入鹽沸湯調服如脾氣腹脹心口滿

悶每服三錢水一盞入生薑一塊切棗二枚擘破鹽少許

煎至八分不拘時和滓熱服

膈氣散

治五膈氣三焦痞塞胃膈滿悶背脊引疼心腹膨脹

脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦

少力短氣煩悶常服順氣寬中消痰癖積聚散驚憂恚氣

三稜炮

蓬木炮

肉桂去粗

益智仁

陳皮

枳殼去麩炒

檳榔各

肉苳蔻

木香

乾薑炮

青皮去白

厚朴去粗皮生

甘草炙各

右為細末每服二錢水一盞入生薑二片棗半箇煎七分

和滓不拘時熱服如不煎入塩少許沸湯點服亦可
五膈丸 一名懸珀丸 治五膈氣噎滿悶不下食心胃壅塞

琥珀研一 木香炮 訶梨勒炮去 陳橘皮去白

昆布洗去 桃仁去皮炒 白木三分 官桂去粗

半夏湯洗 枳殼去穢炒 五味子 檳榔

大黃各半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心生薑

棗湯下

沉香丸 治膈氣

沉香 木香 丁香 茴香

青橘皮 枳實各一 檳榔二 阿膠一分

吳茱萸二分 牽牛三 醋浸 乾果

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯下

羚羊角丸 治五膈氣心胃妨則食少胃虛四肢無力

羚羊角屑 人參去蘆 桂枝各一 乾薑炮

甘草炙刀 赤茯苓 訶梨勒皮各二

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服五十丸不拘時煎陳皮湯下

草薺薊丸 治五膈氣飲食難下胃膈噎悶四肢不利

草薺薊去皮 附子炮裂去 遠志去心 乾薑炮

細辛 桂心 川椒去目并合口者

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如彈子大不拘時候含

一丸嚥津

萊菔木香散 治膈氣喘促腹脇脹滿胃膈不快痰逆惡心不

思飲食

萊菔子二升 粟米一升 陳皮湯浸去 木香一分

巴豆三味者二十枚去皮於瓦器內炙上

右為細末用煮萊菔湯調下二錢或以生薑汁煮麪糊為

丸如梧桐子大以萊菔湯下十五丸亦得

狀元丸 治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

巴豆五粒取霜 神麴末半月 半夏洗一月 樵黃三斤好

白麴一月

右研和勻滴水和丸如小豆大用細米糠炒變赤色每服

三丸食後溫水吞下童子二歲三四歲服一丸歲半服半

丸止嗽用薑汁下止嘔吐用生薑湯下

通寧散 治五膈氣胃中不利臍膈壅滯宜服

牽牛各一月五分 木香一月 檳榔三分 乾薑也

桂心各一分

右為細末每服二錢以熱酒調服空心可二服續續更以

一兩盞熱茶投之得利三兩行下得惡物是効

桃花散

治五膈氣飲食不下漸致羸瘦

桃花

當年

攪擲

縮砂去皮

牙硝各二

吳茱萸

更一兩湯浸炒

右爲細末每服一錢不拘時溫酒調下

治膈氣

右用附子一箇先以鉋子炒石灰令十分熱埋附子於灰中候灰冷取出將石灰依前法再炒埋如此三次然後取附子去皮臍入丁各四十九粒不見火同爲細末空心以糟茄兒二兩片翻覆蘸藥食之然後食物

治膈氣

右用大鯽魚一尾市中自死者可用活魚則不効剖腹去盡腸物留鱗用大蒜去淨皮薄切片填入魚腹內仍合魚

為一尾用濕紙裹定用麻皮纏之却用熟黃泥厚厚外固
曬微乾以碎碎灰火慢慢煨熟取出去鱗并刺骨入局方
平胃散末搗和可為丸如梧桐子大日乾搥收勿令泄氣
味每服三十九空心用米湯送下

治膈氣噎食久成翻胃

右用牡老薑一片連皮洗淨切如大錢厚以踈竹羅子盛
入寺觀內廁坑中浸七日取出長流水中漂七日取出晒
乾為末每淨末一斤入甘草末一两和勻每服二三錢米
飲調徐徐服次用高良薑去毛切片清油炒變色為末陳
米飯為丸如梧桐子大每服二三十丸至五十九漸漸米
飲調良薑末送下忌生冷難化之物

瑞香散

治五種膈氣陷胃正氣進食

南木香

檳榔畏

阿子炮去

肉桂去皮不

川薑炮 麥蘖炒 白茯苓去皮 白木炮

人參去芦 青皮去白 荆三稜炮 苧草炙

丁香一分 白帶豆一分生炒

右為細末每服一錢紫蘇鹽酒湯調服

萬靈木香丸 治膈氣咽喉噎塞

木香一分 檳榔一兩 縮砂去皮 官桂去粗

陳皮白湯浸去 肉苳菟去殼 懷香子炒 乾薑炮各

附子一枚炮裂

右為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大以丹砂為衣每服

二十丸不拘時生薑湯下茶酒下亦可

乾燕妙功丸 治膈氣咽喉噎塞咳嗽上氣痰盛喘滿氣道痞

滿不得升降

蓬砂二錢 丹砂四錢 硃砂一錢 巴豆霜三錢

益智仁

官桂 各半兩

右各別研為極細末拌和勻用糯米粥為丸如麻子大每

服一九或二九食後臨寢乾嚥下

導氣散 治膈氣噎塞不入飲食

虎頭王字骨

醋炙額骨是也

華撥 微焙

人參 去蘆

羚羊角

錫屑

厚朴 去粗皮生薑分

右為細末每服二錢溫水調食後臨睡服

分氣丸 治膈氣嘔逆不下食

白朮 炙炒

木香 煨

蓬朮 煨

陳皮 白朮煨去

桂心 去粗皮

縮砂 去殼

懷香子 炒

乾木瓜 切

益智仁 炒

乾薑 炮

甘草 炙各兩

胡椒 半兩

阿魏

一分醋化白和作餅炙

右為細末湯浸蒸餅和丸如芡實大每服一九不拘時用

溫湯嚼下

無比丸 治膈氣嘔逆不下食

乾薑

附子炮去

官桂去油

澤瀉各一

巴豆

十四枚去

右為細末和勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九至五九

溫酒送下早晚各一服

旋覆花散 治胃中痰結痞塞不通不能飲食

旋覆花

大腹皮

附子

炮裂去

木香

各半

赤茯苓

山木

前胡

去蘆

半夏

湯洗

桂心

芩窮

人參

各一

青皮

三分湯浸

右以咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時稍熱服

半夏五香丸

治膈氣痰結和胃氣進飲食

卷之十六

半夏湯浸七次洗去滑地為末生

沉香 木香 藿香各半 麝香研

龍腦研 丹砂研 甘草炙各 檳榔二枚

右為細末煉蜜和九如彈子太每服一九空心食前細嚼用生薑鹽酒送下

芫花丸 治膈氣痰結痞塞心胃壅悶

芫花醋拌炒 桔梗去蘆 杏仁湯浸去皮尖及

桂心已上各 巴豆半兩去皮心膜

右為細末煉蜜和搗二三百杵九如小豆大每服二九食前以溫酒下

厚朴湯 治膈氣宿食不消

厚朴去粗皮一兩半生薑 青皮湯浸去 麥蘖炒

人參 柴胡 訶黎勒皮用 麻黃去根節

烏頭

炮裂去

陳皮

白湯浸去

甘草

炙

陳麴

炮各一兩

上

草薺

高良薑

五味子

桂心

去皮

各半兩

益智

二兩去皮

乾薑

分

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚擘破同煎至七

分去滓不拘時稍熱服

寧澄茄散

治膈氣壅滯脾胃虛弱宿食不消四肢乏力

草澄茄

訶梨勒皮

細辛

各一

人參

去蘖

草薺

去皮

荆三稜

俱

木香

半夏

湯浸洗

各半兩

五味子

高良薑

青皮

白湯浸去

甘草

炙

各半兩

上

白朮

大腹皮

各三

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不拘時稍熱服

神麴丸

治膈氣不下食縱食不能消化

神麴炒

麥蘖炒各四兩

厚朴二兩去粗皮生薑汁炙令香熟

乾薑地

檳榔

桂心各一兩

訶梨勒皮

陳皮

湯浸去白焙各一兩半

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

丸不拘時用淡生薑湯送下

枳殼丸 治脯氣脹滿喫食妨悶手脚煩疼漸加羸瘦身體無

力並皆治之

枳殼炒

木香

赤芍藥

羚羊角

檳榔各一兩

前胡去蘆

赤茯苓各二兩

麥門冬去心焙

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十

丸不拘時以粥飲下

枳實散

治脯氣心胃中氣逆時作疼痛

枳實炒

黃芩炒

桂心

各二兩

右為細末每服一水不拘時用熱酒調下

華撥飲 治膈氣心腹痞滿全不思食

華撥

沉香

丁香

華萱寇

青皮

去白

桃仁

去破

生薑

切焙

大腹子

各

枳殼

麩炒

甘草

炙

訶梨勒皮

二刀

右以咀每服三杯水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

華萱寇丸

治五膈氣脾胃久冷嘔吐酸水脘腹疼痛不思食

華萱寇

去皮

枳實

麩炒

雞舌香

陳皮

湯浸去白

吳茱萸

湯浸

焙

乾薑

炮

枳實

麩炒

雞舌香

陳皮

湯浸去白

吳茱萸

湯浸

焙

當歸

洗

檳榔

木香

各半

桂心

三分

右為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三十九丸不拘

時用熱酒送下

昆布丸

治五噎嗝咽妨塞食飲不下宜服

昆布洗去鹹水

麥門冬去心

天門冬去心

訶梨勒去核各

木通

川大黃微炒

川朴硝

郁李仁湯浸去

桂心

百合各一

羚羊角屑

杏仁湯浸去皮

紫蘇子微炒

射干各半

柴胡去芦

陳皮湯浸去

檳榔各一

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十

丸不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大一丸嚥化

治五噎立効方

批杷葉拭去毛炙

陳皮湯浸去

生薑半斤

右件藥都以水二大盞半煎至一大盞半去滓不拘時候

分溫三服

竹皮散

治噎聲不出

竹皮

一方用藥細辛

通草

人參

五味子

茯苓

麻黃

桂心

生薑

甘草略一

右咬咀以水一斗煮竹皮下藥煮取三升分三服

治男子婦人氣噎病

鷄嗉子

凡竹和商食用溫水浸黃泥子內食不可去分毫

木香

丁香

沉香

各一

右為細末用大棗煮熟去皮核研和丸如梧桐子大每服

三十丸食前用米飲送下

治胃中氣噎食不下者喉中如有肉塊方

昆布

二月洗去鹹水小麥二合

右件藥以水三大盞煎候小麥爛熟去滓每服不拘時喫

一小盞仍揀取昆布不佳含三兩片嚥津極効

治胃膈氣滯食噎不下方

右以手巾布裹杵頭糠時也試齒治卒噎刮春米杵頭
細糠含之煎湯呷亦得

東坡先生家藏五行記云

絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾骨視
有何物言終而卒弟子依言而開視胃中得一物形如魚
而有兩頭適体是肉鱗弟子置器中跳躍不止戲以諸味
皆隨化及時夏中藍多作靛有一僧以靛置器中此蟲遂
透盤中走須臾化為水故世藍靛治噎有效一方治膈氣
咽喉壅塞飲食不下

生薑汁煎 治噎不能下食咽喉壅塞心胃煩悶

生薑汁

白蜜

牛酥

各五

人參為末

百合

為末各二

右件藥內銅鍋中以慢火煎如膏不拘時候含一匙如半

棗大嚙滓或煎人參湯調下一茶匙亦得

食菹散 治五種膈氣能治氣補勞通血脉益脾胃去痰飲

肉苳菹 五枚 木香 人參 厚朴 薑製

赤茯苓 官桂 檳榔 訶子 煨去核

青皮 陳皮 甘草 炙 郁李仁 炒去皮

右為細末每服一升半鹽湯調不拘時服右吹咀每服七

錢水二盞薑棗各三枚煎至一盞去滓不拘時服亦可

人參利膈丸 治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯推陳致新

治膈氣聖藥

人參 當歸 藿香 枳實

甘草 炙各 木香 檳榔 各七 厚朴 薑製

大黃 酒浸各

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十丸食前

用米飲送下

秦川剪紅丸 治膈氣成翻胃服此吐出瘀血及下蟲而効

雄黃別研 木香各五 檳榔 三稜煨

蓬木煨 貫仲去毛 乾漆炒烟 陳皮各一

大黃半一兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下

寬中丸 治氣不升降胃膈痞結

木香 青皮 三稜各半 大腹子二枚

半夏湯泡洗

右為細末薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸不拘時用倉米湯下

入藥靈砂 治翻胃嘔吐飲食不下

靈砂 一月

丁香

木香

胡椒各五

右件煮棗肉并和為丸如梧桐子大每服五十九用生薑湯下

丁附散

治翻胃嘔逆粥藥不下者

大附子

一隻坐於磚石凹面著火煎斷通熱片入生薑汁中浸一霎時再用火過再拌薑汁不半乾去火焙乾研為末

丁香

二枚研為末

右和勻每服二錢水一盞粟米少許煎至七分去滓溫服

掌中金

治證同前

大附子

一隻薑汁一盞煮乾

母丁香

一箇

右為細末以少許安掌中舐服

正胃散

治證同前

右用白水牛喉去兩頭節并筋膜脂肉節上取下如阿膠

片以好米醋一大盞浸微火頓番勻炙乾再蘸再炙醋盡

為度存性不要見日火焙燥為末每服一錢陳米飲下

敵痰丸 治翻胃嘔噎

半頁麴炒 枯礬各一兩 皂角火炙刮去皮

黑牽牛取頭末三兩

右為細末用蘿蔔莖熟搗爛和丸如梧桐子大每服五十丸食遠用生薑湯送下

太醫院經驗奇効良方卷之十七

脾胃門 附論

夫脾胃者清純冲和之氣位居中州其屬土也無物不入無物
不包榮衛出焉而脾又受胃之稟行其氣血灌溉諸經榮養百
骸生發諸陽上升之氣元氣由此而充焉故為十二經之海常
以食入於胃散精於肝滯氣於筋食氣入胃濁氣歸心滯精於
脉脉氣流經氣歸於肺肺朝百脉輸精皮毛毛脉合精行氣於
府府精神明流於四臟氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以決
生死也飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通
調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆
度以為常也凡人之生皆以胃氣為本經云穀入於胃脉道乃
行水入於經其血乃成若人絕水穀則死蓋胃氣絕而故也正
所謂安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛消

將何以立此之謂也蓋天地以生五氣五味人之所養莫重於此慎勿以太過不及以傷其正故曰陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味可不謹乎此乃大經大法故調經篇論云病生陰者得之飲食居處陰陽喜怒五亂交作病則身熱頭痛目眩体重四肢不收怠惰嗜卧實者則腹脹中滿停食霍亂虛者為嘔吐噦逆泄瀉浮腫惡心又曰飲食勞倦則傷脾脾傷則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之削也蓋脾好乾惡濕或濕邪所滯為五泄變為痢為疸原病式云諸濕腫滿皆屬脾土土衰則不能制水水泛四肢上乘於肺為腫為滿為喘為小便不利為泄瀉為飲食停積胃口脾不能化轉而為痰變生嗽喘眩暈嘈雜噦氣吞酸翻胃吐食胃脘當心而痛有脾間蟲動其為痛也氣血痰水食積風冷諸證之痛每每停聚而不散惟蟲痛則乍作乍止來去無定又嘔吐清沫之為可驗又有動

氣按之牢若痛者脾胃虛之故也。若人湯飲入胃至脾，便者由精不輸於脾，不歸於肺，心火上攻，令人口燥咽乾，陰火太盛也。東垣發明迨盡其旨之要，人之百病皆由脾胃虛而生也。至於經論天地之邪氣感則害人五臟六腑，及形氣俱虛，乃受外邪，不因虛邪賊邪，不能獨傷人乎？豈不從脾胃虛而生明矣？然所傷之因不一，為病多端，分而其略，飲食傷胃，勞倦傷脾，飢則損氣，飽則傷氣，勞則氣耗，逸則氣滯，及喜怒憂恐皆能損胃之元氣，而為不足之證。惟飲食所傷者有異耳：一則內弱，強食填塞不化，此有物也；屬乎尅伐，一則中虛，少食痞滿難運，此不足也。屬乎補養，醫者便以飲食內傷中氣不和之病治之，而分何物所傷，又不審傷物之有無，又不辨脾胃之強弱而撓按局方之劑，輕以香熱尅化，重以巴豆攻逐，一途取利，實上虛上之禍，豈小哉？實者則已虛者愈損，其胃甚至病轉危殆而死者。

有之、今將治法分類施之、是以物各有性、若傷於飲者、飲乃無形之物、或微汗散之於表、或淡滲利之於下、或若溫以燥其中、傷於食者、或損穀以和之、或強脾以磨之、果因食物停滯甚盛、而作悶亂者、吐下以奪之、中有物傷於寒者、則熱之、傷於熱者、則涼之、寒熱共傷者、各從其性以和之、傷於魚肉菜菓之類、水其氣之相尅而相制者、用之、如礪砂、阿魏治肉積、胡黃連、麝香治菓積、神麴、麥蘖、礞石、巴豆皆治酒積、食積、痰積、是皆有形之物、填塞不化、必待驅逐、然後從其所宜制之、而得安、豈可一例而用香熱藥也、若夫飲食勞倦、內傷中氣、脾胃虛弱、虛滿不食、使營運減削、不能輸精皮毛、行氣六腑、發為諸證、此乃不足之邪、理宜溫之和之、調之養之、必使生氣增益、胃氣完而後愈也、脾胃之證、前人所論甚詳、後學必須誠究、決無妄虛之咎、豈可輕易哉、

脾胃通治方

嘉禾散 治脾胃不和胃膈痞悶氣逆生痰不進飲食如五噎

五膈並皆治之

方見膈噎門

四君子湯 治脾胃不和不思飲食

人參 去蘆

茯苓 去皮

白朮

甘草 炙

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

六君子湯 治脾胃不和不思飲食

人參 去蘆

茯苓 去皮

白朮

甘草 炙

半夏 湯泡

陳皮 去白各

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

平胃散 治脾胃不和嘔吐惡心不思飲食

蒼朮

米泔水浸三錢厚朴 去皮薑 陳皮 去白

甘草 炙

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食遠服
一方加草菓名草菓平胃散或為細末每服二錢用鹽湯
調服亦可

二陳湯 理脾胃消痰飲

陳皮 去白 茯苓 去皮 半夏 湯洗 甘草 炙各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

參苓白朮散 治脾胃不和飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病

後調理脾胃

方見痢門

千金大養脾丸 治脾胃虛弱停寒留飲膈塞氣噎翻胃吐食

常服養脾壯氣多進飲食

枳殼 麸炒 神麴 炒 陳皮 去白 麥蘗 炒

三棱 煨 茴香 炒 白蘆 炮 肉苁蓉

細砂去支

蓬朮煨

茯苓去皮

良薑

益智去殼

胡椒

木香

藿香去梗

薏苡仁

紅豆

白朮

丁香

人參

白扁豆炒

苦梗

山藥

甘草各等分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食遠細嚼用白湯或溫酒送下

養胃湯

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或有外

感寒熱如瘡骨節煩疼宜服之

藿香去梗

厚朴製

半夏湯泡

茯苓去皮各

草薢仁

陳皮去白

人參去蘆

附子炮

甘草炙各

白朮七分

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚烏梅半箇煎至一

鍾食遠服

丁沉透膈湯 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十
膈五噎痞塞不通並皆治之

丁香

白荳蔻

肉荳蔻

青皮

去白

麥蘖

炒各五分

半夏

湯泡

神麴

炒

草菓

各三分

沉香

厚朴

鹽製

藿香

陳皮

各七分

香附子

炒

縮砂仁

人參

去蘆各

木香

五分

白木

二分

甘草

炙半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服
透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胃膈滿悶噎塞不通噫氣香

酸脇肋刺脹嘔逆痰涎食飲不下並皆治之

木香

白荳蔻

縮砂仁

檳榔

枳殼

麸炒

厚朴

鹽製

半夏

湯泡

青皮

去白

陳皮 去白

大黃

朴硝

甘草 炙各

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

凝神散 收欬胃氣清涼肌表

人參

白朮

茯苓

山藥 各半

白扁豆

知母

生地黄

粳米

甘草 炙

淡竹葉

地骨皮

麥門冬 各五

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

枳木丸

治痞消食強胃

枳實 炙

一錢

白朮

二兩

右為細末用荷葉包米煨熟飯搗和丸如梧桐子大每服

五十丸不拘時白湯送下

木香和中丸

治脾氣益腎水消腸胃中積聚癥瘕癖塊宣暢

三焦和脾開利胃膈氣逆攻心脇肋脹滿痞痛身體困倦

大小便不利並皆治之

木香

沉香

檳榔

枳實

去穢

青皮 去白

蓬木

橘皮

去白

當歸

酒浸

黃芩 去腐

木通 去皮

黃連

白芷

郁李仁

去穢

牙皂連子

各一

三稜

各一

縮砂

仁二兩

香附子

去毛

黃蘗

去皮

牽牛

取頭

大黃

蒸四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服二錢不拘時生薑

湯下或茶湯下亦可

治中湯

治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉

人參 去蘖

乾薑

炮

青皮

去白

陳皮

去白

白朮

甘草

炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服如嘔吐不已加半夏

二錢丁香一錢名丁香溫中湯

進食散 治脾胃虛冷不思飲食

青皮去白 陳皮去白 良薑炒

肉桂去粗

川烏頭炮 草薢 甘草炙 訶子煨

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾空心服

思食調中丸 治脾胃久弱三焦不調氣滯胃膈痞悶不食嘔

逆惡心或吐痰水

人參 檳榔各半 神麴炒 麥蘖炒

陳皮去白 半夏麴 木香 沉香各半

烏藥一兩 白木半

右為細末蜜調白麴打糊為丸如梧桐子大每服三十九

食遠用米飲湯送下

八味湯 治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臟腑虛滑

吳茱萸湯洗 乾薑炮 肉桂去粗 人參去蘆

當歸洗焙

丁香

木香

陳皮各一

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

補脾湯

治脾胃虛寒泄瀉腹痛氣逆嘔吐飲食不消

人參去芦

茯苓去皮

草薢去皮

乾薑炮

麥蘖炒

甘草炙各一

厚朴去皮

陳皮

白朮各一

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

養脾丸

治脾胃虛寒心腹脹滿嘔逆惡心臍寒泄瀉

人參去蘆

白茯苓去皮

麥蘖炒各

白朮二兩

縮砂去皮

乾薑炮各

甘草炙一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作八丸每服一九不拘時細嚼

用生薑湯送下

白朮湯

理脾和胃順氣進食

白朮

厚朴

桂心

乾薑

桔梗

人參

茯苓

當歸

甘草絡半

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾不拘時服
天下受拜平胃散 治脾胃不和嘔吐痰水胃膈痞滯不美飲食並皆治之

茅山蒼朮

去皮米泔浸一宿五兩少

厚朴

去皮製

陳皮

甘草

生薑各三兩

紅棗

二百枚

右件用水五升煮乾搗作餅子曬乾再研為細末每服二錢食遠用鹽湯調服治泄瀉用生薑湯調下

和中益氣丸

治脾胃不和氣不升降嘔吐減食口苦吞酸胃

滿短氣肢體怠墮面色痿黃中焦虛痞不任攻擊臟氣久

寒不受峻補又療心胃悞悞如滿五飲停滯不散常服和

中益氣進羹飲食或大便不通尤宜服之

木香

丁香

各半兩

肉苳蔻

茴香

微炒

京三稜

炮剉

白荳蔻

人參

去薑

官桂

去粗皮

縮砂仁

二兩

青皮

去白

陳皮

去白各四兩

右為細末用白麪糊為丸如梧相子大每服六十九至七

十九食遠用溫生薑湯送下

穀神丸 消食健脾胃益氣進羹飲食

人參

縮砂

香附子

炒

三稜

蓬木

煨

青皮

陳皮

神麴

麥蘖

炒

枳殼

各等分

右為細末用粳米煮糊為丸如梧相子大每服三十九空

心用米飲送下鹽湯下亦得

快活丸 消導飲食順氣健陽住小便

丁香

木香

官桂

茴香

乾薑

蒼木

去皮各半兩

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五七十粒食前用好酒送下

延年草 邢和璞真人常服安神導氣消酒食益脾胃老入小

兒皆可服清晨食後嚼數片安神健體賜呂申公劉斯立

秘之名延年草

上等白鹽花

五兩再煎新舶上茴香

四兩

青皮

一斤湯浸三日候水很苦味出盡然後去穢切作指面大方片子

甘草六兩炙

右用甜水一斗同藥入銀鍋內熬不住手攪勿令着底置

密器中收不得走氣候水盡取出慢火炒令乾不得有炒

焦氣選勤謹者一人專一掌之去甘草茴香不用只取貯

青皮如傷生冷及菓實蔬菜之類即嚼數片氣通即無恙

常服一兩片極佳以其尤宜老人邢和璞所以名延年草
斯立又以延年自之也

一方治心腹虛膨手足厥冷或飲苦澁涼劑晨朝未食先嘔或
聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛弱

右用山藥剉如小豆大一半銀石器內炒熟一半生用為
末不拘時用米飲調二錢服之

辟寒湯 治脾胃寒弱嘔逆惡心腹脇脹痛

茴香 三兩 高良薑 二兩 胡椒 半兩 丁香 一分

甘草 二兩 白鹽 三兩 同

右為細末每服一錢不拘時沸湯調服

丁附丸 治脾胃虛寒嘔吐不止

丁香 一兩 附子 炮 草薤菹 剉 胡椒 各半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸不拘時服

細煎橘皮湯下

棗附丸 治脾氣虛弱大腸冷滑臟腑泄瀉米穀不化飲食無

味乏力短氣常服益脾壯氣

方見泄瀉門

神麴丸 治脾胃冷氣不和心腹疔痛脇肋氣滯不思飲食四

肢少力

神麴

一兩炒

乾薑

炮裂

附子

炮裂去

橘皮湯浸去

甘草

炙

桂心

各半

當歸

剉

人參

去蘆各

檳榔

一兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

丸不拘時生薑橘皮煎湯下

至靈散 療食飽煩悶但欲卧而腹痛

用神麴炒令香黃為細末不拘時用米湯調服方寸七用

大麥蘗亦佳

白芷冠丸 治脾胃不和不能飲食

白芷冠去皮乾薑炮裂 白朮各三

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九用薑棗煎湯送下空心食前服

脾不磨方

脾虛不磨塞心胃 腹滿腹脹如物攻

但將五膈煎三服 可送尋常小理中

傷脾方

病後傷脾胃膈滿 老人強食氣必短

更兼可食惡心來 草菓寬中煎一椀

右病後傷脾經令人氣必短用寬中散加草菓二箇灰火炮對用水二鍾生薑十片煎至八分去滓不拘時服

四炒健脾散 進食極妙

蒼木四兩 乾薑四兩 甘草五兩半

烏頭大兩以紅水浸七日取出切半以鹽四兩炒乾或

右為細末每服一錢食前用白湯入鹽調服

消穀丸 治脾胃氣弱飲食多傷胃膈痞悶可思飲食

肉苳菟二兩 檳榔火炮各二兩 神麴二兩 青皮去白

京三稜炮切 橘皮六兩 麥蘖炒各二兩 木香半兩

右為細末用湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九食

後用橘皮湯送下

丁香附子散 治脾胃虛弱胃膈痞結吐逆不止

丁香四十粒 附子一兩 生薑半斤取白

右將附子鑽孔四十九箇以丁香填在孔內將生薑汁用

文武火熬盡取大蘿蔔一箇取一穴子入附子在內仍以

蘿蔔蓋之用文武桑柴火燒香熟為度取出附子切片焙
乾為細末每服一錢用米湯一盞調服日進三服甚妙
粟附丸 治脾胃氣虛四肢倦怠肌體瘦弱橫膈受濕大便頻
數不思飲食

陳粟米一升附子一兩

右同入鍋銚內用水煮令附子透取出附子切作片焙乾
別取陳粟米半升水淘淨控乾慢火炒令香熟同附子碾
為細末却用元黃附子者粟米飲和為丸如梧桐子大每
服三十丸加至五十丸陳橘皮湯下空心食前服

和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰
逆噎氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少
力嗜卧體重節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞
滿並宜常服老幼氣弱皆可能和中溫脾胃進飲食

厚朴

去粗皮剉碎以生薑二升水同炒

半夏

一半湯洗日乾切

龍甲

九功大者一個黃泥封固少米醋半盞化開取

神麴

炒一及於龍甲內

白朮

剉炒

枳殼

去穢

青皮

剉炒

人參

各三

訶子

剉炒

陳皮

剉炒

當歸

各一

芍藥

甘草

炙各

赤茯苓

去皮

乾薑

炮各

右為細末煉蜜和丸如小豆大每服二十九加至三十丸

微嚼碎用溫水送下不拘時服

大建脾丸 調中養氣和胃健脾治中焦積寒胃膈氣痞嘔逆

惡心腹脇疼痛臟腑虛滑飲食多傷困倦少力肢體怠惰

少精神

肉桂

剉炒

厚朴

剉炒

白朮

剉炒

丁香

甘草

剉炒

肉桂

剉炒

乾薑

炮

丁香

胡椒

附子炮去

木香

華撥

神麴炒

麥蘖炒

人參去蘆

白茯苓去皮

白芷蒸

白朮各半

訶子去核二枚半

布爲細末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼用溫米飲送下食前服

吳茱萸丸 大理脾胃腎臟不通胸中順氣方治冬三月陰氣

在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏周客之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實若腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令致病者善嚏鼻流清涕寗甚出濁涕嚏不止此常人大惡風寒小便數而欠或上飲下便色清而多大便不調夜寒無寐甚則爲痰咳爲嘔爲噦爲吐爲唾白沫以致口開舌蹇氣不交通欲絕者此藥主之

吳茱萸

草薺

卷仁 各一分

益智仁

人參

黃耆

升麻 各八分

白殭蠶

澤瀉

薑黃

柴胡 各四分

當歸身

甘草

炙各六分

木香

二分

青皮 三分

半夏 一子

大麥蘖

五分 木橘皮 八分

右為細末用湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服三十丸細嚼用白湯送下無時夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天助正氣而勝其邪氣不治而自愈然亦有當愈而不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈噎不通咽中如梗甚者前證俱作治法當從時利膈丸瀉肺火以黃耆補中湯送下如兩足痠厥行步顛然欹側欲倒脾脘如折及伏痛而無力或氣短氣促而喘或不得倚息以黃耆人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓橘皮等作

湯送下滋腎丸一百五十九六七月之間濕熱之令大行
氣矩不嚴言者加五味子麥門冬如心下痞胸悶食不下
以上件白朮蒼朮等湯下消痞丸五七十九更審而用之
溫脾散

青皮

陳皮

縮砂仁

乾薑

舶上茴香炒 檳榔

白芷

良薑

厚朴各一

木香

香附子

麥蘖

白朮各半

紅豆

三分

甘草

半

右咬咀每服三錢水一盞半煮一校煎七分空心服

大蘗香散

大治一切心肺脾胃氣變為萬病服之皆愈盛季

文傳於賀方回云頃在河朔因食羊肝生肝胃泄瀉膿血
仍發嘔吐霍亂心腹脹痛時出冷汗四肢厥逆不可忍邑
宰万俟湜懷此藥煎以進再服即定

薑黃葉

三兩

白乾薑

半兩

木香

青皮

去穢炒

神麴

炒

人參

去蘖

良薑

炒

肉苳菴

去穢炒

訶子

煨

白茯苓

大麥蘖

炒

厚朴

鹽汁炒

陳皮

去白

甘草

炙各

右爲細末每服二錢吐逆瀉痢不下食或嘔酸苦水翻胃惡心並用水一盞煨生薑半塊擘破同煎鹽一捻安盞中候煎藥七分熱呷水瀉滑瀉腸風臟毒陳米飲熱調入鹽少許下赤白痢煎甘草黑豆湯下脾元受虛邪變爲寒熱或脾胃虛冷醋心氣脹宿滯酒食噫滿不化膈上不快面色積黑痰氣作暈頭目眩掉水一盞薑三片棗一枚擘開同煎七分入鹽少許嚙薑棗湯熱服胃氣吃噫生薑自然汁半茶脚入鹽點熱呷絕不思食或吃少氣弱膈滿煨薑一小塊先嚙入鹽點熱呷中酒亦如之一切氣膈變成百

病如上服之不拘時如湯點入薑薑紫蘇尤佳大能消食
順氣利膈開胃功效不可細述

白木沉香散 墜氣益脾胃

沉香

人參

白茯苓

半夏麴

木香

訶子肉

乾薑各一兩

乾山藥

白木各半

丁香半兩

附子二箇

甘草大錢

右爲細末每服二大錢水一中盞生薑三片棗子一枚木

瓜一片煎七分食前服

桂麴丸 健脾胃進飲食化生冷溫中下氣治食少易傷胃

滿惡心或心腹疼痛病後衰弱氣不復常

桂心

陳皮湯浸

肉苁蓉去酒

縮砂仁

良薑

乾薑炮

華撥

人參

白木略一

神麴三兩到

丁香

甘草到沙各

右為細末用湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十九加至七十九食前用米飲送下

豈菟橘紅散 溫脾胃升降陰陽和三焦消宿食

白豈菟 去皮 橘紅 去白 人參 去芦 厚朴 姜製

半夏 麴炒 神麴 炒 乾薑 炮 藿香 葉去土

白朮 甘草 炙各半 丁香 木香 各一

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分食

前溫服

木香啓中湯 補脾胃進飲食寬膈順氣

木香 人參 白朮 茯苓

陳皮 半夏 枳殼 香附

縮砂 白豈菟 甘草 各等分

右咬咀每服六錢水一盞半生薑七片棗一枚同煎至八

分去滓不拘時溫服

丁香和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞胃膈停痰嘔吐惡心脇

肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中和胃止嘔進食

丁香

木香

沉香各半

藿香葉

白荳蔻去皮

白茯苓去皮

陳皮去白

白朮

人參

各一兩

半夏

三兩

右為細末生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十九
加至五十丸不拘時用生薑湯送下

是齋安中湯 治脾胃一切寒疾不利

三稜炮

蓬朮炮

乾薑炮

良薑炒

草果仁

益智仁

陳皮不去

甘草

各一分

神麴炒

麥蘖

炒各三分

右為細末每服一錢食遠用鹽湯調服

七珍散 開胃養氣溫脾進食

人參

白朮

茯苓

黃耆 蜜炙

山芋

粟米 炒

甘草 各一兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片棗二枚煎服又方加白扁豆一兩蒸用名八珍散予製此方溫平不熱每有傷寒瘧疾中暑得瘥之後用此藥調理脾胃日三四服十日之外飲食倍常

建脾湯 大益脾胃消痰進食早出胃冷及酒病尤宜服

生薑 一斤洗淨切碎 橘皮 五斤洗淨切碎 鹽 一斤內用鹽四兩 草豈 壹去皮 乾

陳皮 去白 神麴 炒 麥蘗 炒 勿 甘草 炙 各二兩

右為細末每服一錢半用白湯調空心食前服

理中丸 溫脾暖胃逐痰消飲順三焦進飲食辟風寒濕冷之

邪及大病瘥後胃中有寒涕唾不止及治婦人新產五臟

俱虛血脉未定腹痛作瀉最為急證並宜服之

人參

白朮

乾薑

甘草各一兩

右為細末煉蜜和丸每一兩作十九每服一九食前用沸湯化服嚼食亦可或丸如梧桐子大熟水下五七十丸脾病方云肺寒作嗽加五味子阿膠等分

脾肺俱受虛寒作嗽不止加胡椒八分服一名胡椒理中丸二方能理脾溫胃散寒止嗽功效特異脾屬土肺屬金土能生金脾為肺母母能令子實肺受寒而溫理脾胃者此其意也

又治心腹絞痛霍亂轉筋一切沉寒痼冷加附子等分每服一九用水煎化服名附子理中丸

益中丸 健脾胃消化冷痰治中滿脹悶噫氣吞酸心腹時痛不進飲食

神麴炒

麥蘖炒

乾薑炮

長蘆炒

陳皮各二兩

枳殼去穢炒

肉苳菟炙

丁香各半兩

右為細末麴糊和丸如梧桐子大每服五十丸食遠溫米飲或白湯送下

秦綾錦家二十四味養脾丸

治風冷寒濕邪氣腹脹痞滿刺痛腸鳴泄瀉土逆吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切脾胃之疾並宜服之

丁香

沉香

木香各半兩

附子炮去皮六錢

陳皮去白

大腹皮

神麴炒各半兩

大麥蘖炒

肉桂去皮不見火

白木各半兩

厚朴去皮羌製三兩

訶子原去核一兩二錢

人參去芦

茯苓各四兩

縮砂八錢

葶澄茄

白附子炮

良薑炮炒

紅豆去皮紅

胡椒炒

草撥

川薑炮

甘草炙各二錢

生薑十四兩切

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼用白湯送下食前服

六君子湯 治胃膈痞悶脾寒不嗜食服燥藥不得者宜服

人參

白朮

茯苓

陳橘皮

半夏

枳殼

各等分

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎至一鍾去滓不拘時溫服

胃愛散 治脾胃久虛中焦氣滯壅上或有冷涎上潮嘔惡或

胃腹疼痛不思飲食

人參

白朮

茯苓

丁香

甘草

各一分

肉荳蔻

三箇

黃耆

乾薑

各半兩

右用白米二盞同碾為細末每服二大錢水一盞入生薑一片同煎至七分通口服如臟腑不調加丁香十四粒石

蓮肉七粒同煎如前法空心食前服

桂附丸 和脾胃進飲食

桂心 香附子

厚朴

陳皮

蒼朮

三棱

阿魏 別研

并草 各半

肉苁蓉 一箇

右為細末酒煮麴糊和丸如龍眼大每服一九生薑一塊

切開作孔安藥在內合定用濕紙裹煨候熟嚼細鹽湯下

沉香養脾丸

沉香 一分

人參

白朮

肉苁蓉 煨

乾薑 炮

縮砂

丁香

木香

并草 各半

右為細末煉蜜和丸每兩作十九每服一九食前細嚼用

白湯送下或化下亦可

連脾散 通中健胃消食快氣

人參

白朮

藿香

肉豆蔻

丁香

縮砂

神麴

甘草

右為細末每服二錢不拘時用橘皮湯調服

安胃丸 治寒邪傷胃溫中補氣安胃進食

木香半錢

縮砂

白茯苓

青皮各二錢

乾薑炮

陳皮各三錢

大麥蘖

白朮各五錢

右為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三十九食前

用溫水送下忌冷物

大黃瀉熱湯 治脾脉厥逆大腹中熱切痛舌強腹脹身重食

不下心注脾急痛

大黃

三兩細切以水一斗半煎取一宿

茯苓

澤瀉

黃芩

橘皮

細辛

芒硝各三錢

甘草 二兩

右咬咀除大黃芒硝外以水七升煮至三升三合去滓下大黃更煎兩沸并去滓下芒硝分作三服

瀉黃散 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩唇口乾燥壅滯不食

防風 去蘆 四兩

藿香 七錢

石膏 板

縮砂仁

山梔仁

甘草 炙各 半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎七分去滓食後溫服

參附大正氣散 治男子婦人虛弱及瘡安後體氣尚虛眼昏

暗加淨枸杞子陳菊花並各半常服順氣快脾進羹飲食

附子 一個 炮 去皮 鹽人參 去蘆

木香 炙 不見

藿香

縮砂仁

檳榔

白茯苓

益智仁

沉香 炙 不見

草薢仁 煨

丁香 炙 不見

白木 各半

陳皮 去白

香附 去毛

肉桂 不見火

烏藥 必黃

青皮 去白

枳殼 去穢

黃芩 去水

厚朴 姜製

粉草 炙各

右咬咀每服四錢水二盞生薑三片棗一枚煎至八分去

滓空心服

參苓壯脾丸

治脾胃虛弱胃膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛翻

胃吐食上苦吞酸胃滿短氣肢體怠墮面色痿黃及中焦

痞悶不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因病後氣衰食不

復常或元稟受怯弱不能飲食及久患泄痢腸胃虛滑者

並宜服之

人參

茯苓 去皮

白朮

肉桂 去粗皮

乾薑

縮砂仁

胡椒

麥蘖 炒

神麴 炒

山藥

扁豆 炒各

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一九空心細嚼用白
湯或溫酒送下常服育養神氣和補脾胃進養飲食
啓脾丸 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄
瀉不思飲食宜此最佳

人參

白朮

青皮去湯洗

陳皮去湯洗

神麴炒

麥蘖炒

縮砂仁

乾薑

厚朴

法神麴各一兩

甘草炙半

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前細嚼用米
飲送下

升陽益胃湯

脾胃虛乏怠惰嗜卧四肢不收時值秋燥令行

濕熱少退體重節痛口苦舌乾飲食無味大便不調小便
頻數不嗜食食不消兼見肺病洒淅惡寒慄慄不樂面色
惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃

黃耆

半夏

人參去蘆

并草

各一兩

防風

以其秋旺

白芍藥

羌活

獨活

各橘皮

茯苓

澤瀉

柴胡

白朮

黃連

何安秋旺則肺入金白水亏藥之類天神肺為

右咬咀每服三錢水三盞生薑五片棗二枚去核煎一盞

去滓溫服早飯午飯之間服之禁忌如前其藥漸加至五

錢止服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便當少

去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥

力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味之食或羹食助

其藥力益升滲之氣而滋其胃氣也慎不可淡食以損藥

力而助邪氣之降沉也可以少後形體使胃與藥得轉運

升發慎勿大勞役使發傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣未

強少食菓以助穀藥之力經云五穀為養五菓為助者也
黃耆人參湯 脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損
傷元氣怠惰嗜卧四肢不收精神不足兩脚痿軟過早晚
寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足
故或無厭而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而
視物恍恍無所見小便頻數大便難而結秘胃脘當心而
痛兩脇痛或急縮臍下過迴如繩束之急甚則如刀刺腹
雖舒伸胃中閉塞時頭嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰
背脾脹背脊頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自
汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃
庚大勝辛肺金為熱所乘而作當先助元氣理治庚辛之
不足以此藥主之

黃耆

一錢如自汗過
更加一分

升麻 六分

人參 去蘆

橫皮不入 麥門冬去心 蒼朮研 白朮各

當歸身酒洗 炙甘草二 五味子九 炒麴

黃蘗酒洗 以上各三分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠或

心服之忌酒濕麪大料物之類及過食生冷物

如心下痞悶加黃連三分 或

如胃脘當心痛減大寒藥加草薺冠仁 五分

如脇下痛或緒急加柴胡三分 或

如頭痛目中滯火加黃連三分 或川芎三分

如頭痛目不清利上壁上熱加蔓荊子川芎各 藥本

生地黃各 細辛一分

如氣短精神交變寐之間因乏無力加五味子九 箇

如大便澀滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中

伏火而不得潤也加當歸身生地黃麻子仁此正各

批仁三枚湯洗去

如大便通行所加藥勿再服

如大便久不快利勿用別藥少加大黃五

如不利者非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必

顛風蹇躄血藥不可復加之止常服黃耆人參湯藥只用

羌活防風北杜名二味咬咀以水四盞煎至一盞去滓空

心服之其大便必大走也一服便止

如胃中氣滯加青皮散一傳清香可變并去白橘皮倍之去

其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之

如氣滯太甚或補藥太過病人心下有愛滯鬱結之事更

加木香縮砂仁此各二分白芷一分與正藥同煎

如腹痛不惡寒者加白芍藥五分黃芩二分却減五味子

升陽除濕湯 始脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹瀉無度小

便黃四肢困倦並宜服此

蒼朮一木

半夏

益智

澤瀉

羌活

防風

神麴

柴胡

升麻各半

猪苓

陳皮

麥蘖如胃氣弱

甘草分三

右咬咀作一服水三盞生薑三片棗二枚煎至一鍾去滓

空心服

益胃湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰躁熱氣短

口不知味腸鳴大便秘澀黃色身體昏悶口乾不喜食冷

蒼朮半

當歸稍

升麻

陳皮各五

人參

白朮

柴胡

益智仁

黃苓各三

半夏

黃耆

甘草各二分

右以咀作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去滓食前
稍熱服忌飲食失節生冷硬物及酒濕麪一方用紅花少
許名人參益胃湯

草豆蔻丸 治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇
冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大勝相輔
而未尅心乘脾胃此大復讐也經云大勝必大復理之常
也故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又大寒之燥二
氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通
不聞香臭額寒腦痛大惡風寒自時眩不欲開腹中爲寒
冰反乘痰唾涎沫食則反出腹中常痛及心胃作痛脇下
縮息有時而痛腹不能勞大便多滯而少秘下氣不絕或
腹中鳴此脾胃虛之至極也胃中氣亂心煩不安而爲霍
亂之漸咽膈不通極則噎塞有聲喘喘閉塞或於目陽處

或於暖室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體
沉重不能轉側頭不可以回顧小便澀而時躁此藥主之
秋冬寒涼大復氣之藥也

草薺

薺用仁一升四分

神麴

柴胡

詳脇下痛

薑黃

已上各當歸身

青皮

生甘草

炙甘草

各六分

黃耆

人參

益智仁

吳茱萸

湯洗

白僵蠶

陳皮

已上各

澤瀉

半夏

湯洗各

麥蘖

炒一升

桃仁

已上各湯洗去

右除桃仁外餘藥為細末同研勻湯浸蒸餅和丸如梧桐

子大每服五七十九食後用白湯送下斟酌加減

和中丸

治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣滯心腹痞悶嘔逆痰

甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體瘦瘠節煩痰常

服和中順氣并降陰陽消痰止嘔長肌起困進美飲食

藿香葉

去土

人參

去蘆

陳皮

巴豆二錢半同炒
巴豆不用已上各一兩

白朮

白茯苓

去皮

半夏

湯洗七次生薑汁
巴豆七次生薑汁

丁香

不見火

木香

各半兩

石為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五十九食前生薑

湯送下一方用生薑汁煮麪糊和丸食遠米湯下

木香消穀丸

治脾胃俱虛不能消化水穀胃脘痞悶腹脇時

脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少氣又治胃中有

寒飲食不下翻胃惡心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣

或因病氣衰食不復常並宜服之

木香

半兩

青皮

洗淨

陳皮

洗淨焙乾

陳桂

去粗

乾薑

炮各二兩

牽牛

取頭末八兩
半生半炒

右為細末麪糊和丸如小豆大每服十五丸加至二十丸

不拘時用米飲送下

加減思食丸

治脾胃俱虛水穀不化胃脘痞悶腹脇時脹連

年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少氣又治胃中有寒飲

食不下反胃惡心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因

病氣衰食不復常並宜服之

神麴炒黃

麥蘖炒黃

黃芩

烏梅四兩

乾木瓜

切半

白茯苓

去皮

揀甘草

細切

各二兩半

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一九不拘時細嚼用

白湯送下如渴時噙化一九生津液進飲食一方無木瓜

茯苓有人參乾薑銘

法製薑附丸

治脾胃虛弱

香附子

炒大已

碎一片

水浸洗

入銀器中

水三日

曬令香

附

上

日

香

上

有

水

寸餘

取大

二十

筒

去

皮

薑

在

不見

於

五

取

出

用

銀

器

中

水

三

日

香

附

上

日

香

附

上

日

香

附

上

日

香

乾薑

炮四兩

華發

丁皮

縮砂仁炒

胡椒

各二兩

右為細末用蒸餅湯浸一宿用布包裂水和藥如難丸入

少麪糊和丸如梧桐子大每服五十九不拘時白湯送下

更加淨陳皮

二兩用鹽水浸焙乾如寒加附子二兩桂一兩

周馬帥之祖承奉因靖康初自泗州逃難山陽夜行墜古

塚中已先有人在矣至曉散出於塚外得幅紙裹太平

錢八十四文紙上有此藥方云江南上下人弱疾常作於

脾胃脾元壯實則飲食養健自然無病壯脾有藥名曰法

製薑附丸先祖甫弛擔即合此藥無日不服一生無疾壽

年八十四祖母安人服之壽九十六母永國夫人服之壽

九十八安婦雖老皆飲食不減壯年甚妙

水沃雪丹

治脾胃虛弱腹脹減食甚者成水氣作水治即愈

附子

四兩去皮切作片子月小豆四升水一斗煮令水盡候出附子焙乾為末

右用生薑自然汁煮麴糊和丸如梧桐子大每服三十九加至五十九食後陳皮湯下

中良薑丸

溫脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅不通食則輒

吐咽膈噎悶兩脇刺痛嘔吐噦逆噫醋惡心中滿短氣惡聞食晁及瘵留飲腸鳴濕泄冷瀉注下不止常服徒脾胃美飲食辟寒邪養正氣

高良薑

四片乾薑炮

白朮

各二片內桂去粗皮二

甘草

一斤

右為細末煉蜜和丸每兩作十二丸每服一丸空心食前細嚼用生薑橘皮湯下或米飲下亦可

胃丸

治脾胃虛冷食即噤逆水穀不化或時泄利

厚朴

天樞安生薑汁炙黃四兩

乾薑

炮當歸一兩半

續榔剉

桔梗焙

人參各一兩

半夏湯洗七次

陳皮湯洗去白

白朮各二兩

甘草炙半兩

訶梨勒皮三分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服十五丸漸叻至二十九丸溫生薑棗湯下米飲下亦得不拘時服

大溫脾丸 治脾胃中冷水穀不化心腹疼痛嘔逆吞酸不思飲食

神麴炒五兩

乾薑

人參

桔梗

甘草炙各三兩

麥蘖炒

吳茱萸

桂心各五兩

附子炮去

細辛各二兩

枳實炙三枚

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前酒下七丸如

至十五丸日三服忌海藻松菜猪肉生菜一方米飲下

張氏建中湯 治脾胃虛弱胃犯風冷腹痛腸鳴泄瀉經云食

畢而下謂之洞泄手足厥冷面色青白下部虛寒中滿氣

短常服寬中健脾養胃育真固氣大効

附子炮去

胡椒

桂心

吳茱萸湯洗

川烏炮去

乾薑炮

良薑炒

葶藶分

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服五十丸漸加至

一百丸空心食前用米飲吞下

鷄舌香散 治脾受寒濕時作疼痛

良薑

四兩用好油四兩炒令紫色

右為細末每服一錢八分鹽一捻沸湯調服空心食前服

治脾疼

右用荔枝核為末每服二錢熟醋湯調下

脾疼單方

張忠順盛夏調官都城苦熱食水雪過多又飲木瓜漿積冷于中遂感脾疼之疾不釋口殊無退證累歲日漸道

人適一道人曰我受官人供因非所惜但取漢椒二十一
粒浸於漿中盆內一宿漉出還以漿水吞之若是而也張
如所戒明日椒熱下腹即脫然更不復作

炙鷄散

治脾胃氣虛腸滑下痢

方見痢門

治脾胃氣冷喫食嘔逆下痢赤白如麪糊腰腹作痛

右用豬腎一對細研着胡椒陳皮鹽腎椒末等搜麪如常
法作餛飩煮熟空心喫立瘥

治脾胃氣弱下痢日夜不止腸滑不下食

右用野鷄一隻如常法細切着陳皮椒葱鹽醬調和作餛
飩煮熟空心食之

松脂丸 治脾胃氣不和時有泄瀉食少無力宜

松脂

肉苴龜

去殼單撥

縮砂

去皮

人參 去薑

乾薑 炮

木香

白茯苓

麥蘖 炒黃

白朮 已上各一兩

訶子 搗去核二兩

陳皮 半兩兩炒白

右為細末用白蠟鎔和丸如梧桐子大每服三十丸食前用粥飲送下

六君子湯 治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴泄瀉

人參

白朮

茯苓

甘草

訶子 搗去核

肉豆蔻 溫熱裏煨到用專知包壓去油已上各等分

右以咀每服三錢水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾不

拘時服或為細末用熱鹽湯調服亦可

猪臟丸

治臟寒泄瀉飲食不進氣體倦怠

猪苓 多去水浸

右用猪臟頭一截去脂膜淨洗將猪苓入臟內兩頭用

線扎定慢火煮令極爛用醃蒸熟尤好二味於臼內搗碎

十令極細丸如梧桐子大每服五十九食前米湯下

麥酒

治胃脘不能飲食耳目不聰明四肢無力冬卧脚冷服

此酒十日後耳目聰明精神充壯

右於八月三日取麥曝燥把之如五升大六十把水六石
煮一石去滓釀酒如常法隨多少飲之其功甚速

麥門冬湯

治胃熱腸寒善食數飢小腹脹滿

麥門冬

焙去心

甘草

炙剉各二兩

羌活

白茯苓

去皮

旋覆花

玄參

白朮

柴胡去苗

白芍藥

人參

升麻

桑根白皮剉

當歸

切焙各兩

木香

半兩

胡黃連

一分

乾地黄

焙一兩半

右咬咀每服三錢水一盞入甘草一寸同煎至八分去滓
不拘時溫服

大腹木香湯

治胃寒腸熱腹脹泄瀉

大腹子剉

半夏湯洗七次

木香剉各二兩

枳殼去穢炒

前胡去蘖

白芷剉

肉桂去粗皮

陳橘皮湯浸去白

白朮各一兩

延胡索

當歸切焙

旋覆花

柴胡去角

芍藥

甘草炙各半兩

乾薑炮

人參各三分

右咬咀每服三銖水一盞生薑三片經棗三枚煎至六分

去滓食前稍熱服

當歸黃連丸 治胃寒腸熱腹脹泄利

當歸剉焙

黃連去蘖各二兩

赤茯苓去皮

吳茱萸湯洗焙乾炒

厚朴去粗皮剉子

木香已上各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前用米

飲送下月三

升麻湯 治胃熱消穀善飢不生肌肉病名食飮

升麻

山梔仁

赤茯苓

去皮

射干

芍藥四兩

白朮五兩

生地黄汁

蜜

各一

右六味咬咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入生地黄

汁半合再煎兩沸次下蜜半匙共煎取一盞溫服

薑棗丸

治胃寒痰逆噫醋吞酸胃脘不利不思飲食

生薑

去皮切片

附子

炮裂去

丁香

已上各

右爲細末用蒸熟棗肉和爲丸如梧桐子大每服十五丸

加至二十丸不拘時用米飲送下

太醫院經驗奇効良方卷之十七終